

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГЛПС



Как распознать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом:

- Инкубационный период составляет 8-48 дней, в среднем 14-21 день.
- Первые признаки заболевания сходны с симптомами простуды: головная боль, мышечные боли, повышение температуры, снижение аппетита, может быть тошнота и рвота.
- Через несколько дней появляются боли в пояснице или животе, нередко больные жалуются на ухудшение зрения: ощущение «сетки» перед глазами, эти явления могут сопровождаться кровоизлияниями в склеры и конъюнктиву глаза, возможны носовые кровотечения, мелкоточечная сыпь на теле.
- Если вы заметили первые симптомы заболевания, то как можно скорее обратитесь к врачу.

Следует помнить, что геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), которая проявляется лихорадочным состоянием, поражением почек и геморрагическими проявлениями, подвержены люди всех возрастов. Однако наиболее часто заболевание регистрируется у лиц в возрасте от 20 до 50 лет. Преимущественно болеют мужчины (70-80% от всех заболевших).

ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПРОИСХОДИТ:



ПОМНИТЕ, ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В ВАШИХ РУКАХ!